



ENTEROSGEL®

Detoxikační přípravek

Gastrointestinální adsorbent pro užívání při akutním průjmu a syndromu dráždivého tračníku s průjmem

CO JE OBSAHEM TÉTO PŘÍBALOVÉ INFORMACE

- Co je ENTEROSGEL® a k čemu se používá
- Co potřebujete vědět, než začnete ENTEROSGEL® užívat
- Jak se ENTEROSGEL® užívá
- Možné nežádoucí účinky
- Jak ENTEROSGEL® uchovává
- Obsah balení a další informace

1. CO JE ENTEROSGEL® A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

ENTEROSGEL® je perorální suspenze indikovaná pro:
• symptomatickou léčbu akutních průjmových onemocnění,
• syndrom dráždivého tračníku s průjmem (IBS-D).

ENTEROSGEL® je perorální střevní adsorbent (enterosorbent) na bázi organického minerálu s adsorpční schopností vůči některým toxickým a škodlivým látkám ve střevě (např. endotoxiny, enterotoxiny), které fyzicky váže na svůj povrch, a snížuje tak četnost vyprazdňování stolice a trávní průjmu.

ENTEROSGEL® odchází z těla se stolicí a tím odstraňuje adsorbované toxiny a škodlivé látky, což může mít blaho- dárny účinek při léčbě indikovaných stavů.

ENTEROSGEL® zmírňuje průjem, bolesti břicha, nadýmání a nutkání k vyprázdnění u pacientů s IBS-D.

ENTEROSGEL® neobsahuje konzervanty, lepek, cukr, sladidla, laktózu, tuky, ochucovadla, ingredience rostlinného nebo živočišného původu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ENTEROSGEL® POUŽÍVAT

Nepoužívejte ENTEROSGEL® (kontraindikace):
• Jestliže současně užíváte perorální léčiva s modifikovaným (řízeným) uvolňováním.
• Trpite-li střevní atonií nebo střevní neprůchodností (závažnou zácpou z důvodu střevní obstrukce).
• V případě intolerance přípravku během užívání v mimořádnosti.

Upozornění a opatření

- Neužívejte ENTEROSGEL® méně než dvě hodiny před otevřením nebo po užití perorálního léku. ENTEROSGEL® může ovlivnit absorpci některých léčiv, které se podávají perorálně. Jestliže užíváte nějaké léky, můžete se také poradit ohledně použití přípravku ENTEROSGEL® se svým lékařem nebo lékárníkem.
- V případě dlouhotrvajícího průjmu je nutné se před užíváním přípravku ENTEROSGEL® poradit s lékařem za účelem stanovení diagnózy základního onemocnění.

- U dětí by léčba průjmu měla být doplněna podáním dostatečného množství tekutin, případně perorálního rehydratačního roztoku, aby nedošlo k dehydrataci.
- U dospělých osob se doporučuje během léčby přípravkem ENTEROSGEL® příjem tekutin nebo perorální rehydratačního roztoku pro zajištění správné rehydratace.
- Nepřekračujte doporučenou dobu léčby a neužívejte společně s jídlem, abyste se vyhnuli možné adsorpce vitaminů nebo živin.
- Pokud průjem trvá více než dva dny, je nutné se poradit s lékařem.
- Pokud máte horečku, krev ve stolici, známky dehydratace, šest nebo více stolic během posledních 24 hodin, současně průjem a zvratení, silně nebo neustálá bolesti břicha, vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc, zejména jde-li o děti.
- Nepřekračujte doporučenou dávku a nepřekračujte doporučenou dobu léčby.
- Promluvte si, prosím, se svým lékařem, jestliže v současné době užíváte jiné střevní adsorbenty, například přípravky, které obsahují aktívni uhlí, jíl nebo kaolin. Váš lékař vám možná poradí, abyste je neužívali současně s přípravkem ENTEROSGEL®.
- ENTEROSGEL® není indikován k užívání v případě akutní chemické otravy nebo předávkování léky.
- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

ENTEROSGEL® lze užívat během těhotenství a kojení.
Je doporučeno poradit se s svým lékařem, pokud se během těhotenství nebo kojení necítíte dobré. Poradte se, prosím, se svým lékařem před užitím přípravku ENTEROSGEL®.

3. JAK SE ENTEROSGEL® UŽÍVÁ

- Užijte potřebnou dávku přípravku ENTEROSGEL® po první řídké stolicí.
- Užívejte ENTEROSGEL® minimálně 2 hodiny před užitím nebo po užití perorálního léku.
- Užívejte ENTEROSGEL® minimálně 1–2 hodiny před jídlem nebo po něm.
- Před podáním rozdrožte dávku ve vodě pokojové teploty.
- Sáček použijte ihned po otevření.
- Tuba dobré protřepjte před otevřením a každým použitím.
- Tuba použijte do 30 dnů od otevření.



Doba léčby přípravkem ENTEROSGEL® je:

- 3–5 dnů při akutním průjmu.
- Až 30 dnů u syndromu dráždivého tračníku s průjmem. Pauza mezi opětovným užíváním min. 3 dny.
- Před použitím u dětí do tří let je doporučeno poradit se s lékařem.
- Na začátku léčby (Den 1) můžete zdvojnásobit první dávku, a pak pokračovat s jednotlivou dávkou po každé stolici. První den maximálně osm dávek.
- Během léčby chronického průjmu můžete upravovat dávkování tak, aby odpovídalo konzistenci a četnosti stolice. Je možné užít dvoujádrovou dávku až 3x denně, pokud je stolice řídká, nebo snížit na jednu dávku 1x denně, jestliže je stolice normální. Maximálně lze užít šest dávek denně.
- Léčbu přípravkem ENTEROSGEL® přerušte, pokud 1–2 dny nemáte stolici, zvýste příjem vody a pokračujte v léčbě po další stolicí.

4. MOŽNÉ NEŽADOUCÍ ÚČINKY

Zácpa, nevolnost (nauzea)

5. JAK ENTEROSGEL® UCHOVÁVÁT

- ENTEROSGEL® nesmí být použit po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Uchovávejte ENTEROSGEL® při teplotách od 4 °C do 30 °C.
- Chraňte před mrazem.

Nevystavujte nadměrnému teplu ani přímému slunečnímu záření.
Doba použitelnosti uvedená na obalu se vztahuje na rádně skladovaný neotevřený produkt.

Sáčky

- Po otevření lze každý sáček použít jen jednou.
- Sáčky jsou na jedno použití a musí se otevřít bezprostředně před použitím.
- Nepoužívejte opětovně částečně použité sáčky, abyste zabránili mikrobiálnímu znečištění.

Tuby

- Po otevření a každém použití uzavřete pevně víčko tuby, aby nedošlo k vysychání a mikrobiálnímu znečištění.
- Sáček použijte ihned po otevření.
- Tuba dobré protřepjte před otevřením a každým použitím.
- Tuba použijte do 30 dnů od otevření.



Při vymačkávání přípravku ENTEROSGEL® z tuby nebo sáčku se může objevit malé množství tekutiny.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Složení: Polymethylsiloxane polyhydrate (hydrogel kyseliny metylkřemičité) – 70 %, čistěná voda – 30 %.

Velikosti balení

- ENTEROSGEL® perorální suspenze
- Tuba 225 g
 - Tuba 90 g
 - Sáček 15 g (10 sáčků v balení)

LIKVIDACE

Na likvidaci nepoužitého přípravku ENTEROSGEL® se nevztahuje žádnej zvláštní opatření. Přípravek může být bezpečně vhzen do domácího odpadu. Obal lze recyklovat.

Trvanlivost: do data uvedeného na obalu

Máte-li další dotazy týkající se užívání přípravku ENTEROSGEL®, obraťte se prosím emailem na: info@enterosgel.eu.

Tento příbalový leták je k dispozici též v jiných jazycích na www.enterosgel.eu.



BioLine Products

ENTEROSGEL®

Detoxifying agent

Gastrointestinal adsorbent for use in Acute diarrhoea and Irritable bowel syndrome with diarrhoea

panied by plenty of fluids which may include oral rehydration solution (ORS) to avoid dehydration.

- In adults, it is advisable to consume water or an ORS during the treatment with ENTEROSGEL® to assure proper hydration.
- Do not exceed the recommended duration of treatment and do not take together with meals to avoid possible adsorption of vitamins or nutrients.
- If diarrhoeal symptoms persist for more than 2 days you should consult your doctor.
- If there is fever, blood in your stools, signs of dehydration, six or more episodes of diarrhoea in the last 24 hours, diarrhoea and vomiting at the same time, or a severe or continuous stomach ache, seek medical advice especially in the case of children as soon as possible.
- Do not exceed the recommended dose and do not exceed the recommended duration of treatment.
- Please, consult your doctor if you are currently taking other intestinal adsorbents, for example treatments which contain activated charcoal, clay, kaolin. Your doctor may advise not to use them together with ENTEROSGEL® treatment.
- ENTEROSGEL® is not indicated for use in case of acute chemical or drug poisoning or medicinal overdose.
- Do not use beyond the expiry date indicated on the package.

ENTEROSGEL® can be used during pregnancy and breastfeeding. It is advisable to consult with your healthcare professional if you are unwell during pregnancy or breastfeeding. Please, consult your doctor before taking ENTEROSGEL®.

3. HOW TO TAKE ENTEROSGEL®

- Take the necessary dose of ENTEROSGEL® after the first loose stool.
- Take ENTEROSGEL® at least 2 hours before or after taking oral medications.
- Take ENTEROSGEL® at least 1–2 hours before or after a meal.
- Dilute the dose in the water of room temperature before its administration.
- Use sachet immediately after opening.
- Shake the tube well before opening and each use.
- Use a tube within 30 days after opening.



CE 0123
Zdravotnický prostředek třídy IIa

Age	Dosage	How Often
Under 1 year	2,5g (= 1/2 teaspoon) diluted in 7,5–15ml of water.	3 times a day
1-6 years old	5g (= 1 teaspoon) diluted in 50–100ml of water.	3 times a day
7-14 years old	10g (= 2 teaspoons) diluted in 50–100ml of water.	3 times a day
15+ and adults	15g to 22,5 g (= 1 polévková lžíce nebo 1-1,5 sáček) zředit v 200 ml vody.	3 times a day

Duration of the treatment with ENTEROSGEL® is:

- 3-5 days for acute diarrhoea
- Up to 30 days for IBS-D. Break between repeated use should be at least 3 days.
- Prior the use in children under 3 years old is advisable to consult a doctor.
- In the beginning of the treatment (on day 1) you can double the first dose and then continue with a single dose after each bowel movement. Maximum 8 doses on the first day.
- During treatment of chronic diarrhoea, you may adjust your dosage to suit your stool consistency and bowel movements. You can increase treatment to double dose up to 3 times a day if your stool is loose, or reduce to a single dose once a day if your stool is normal. Maximum 6 doses per day.
- Stop the treatment with ENTEROSGEL® if you do not have bowel movement for 1-2 days, increase intake of water and continue the treatment after the next bowel movement.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Constipation, nausea

5. HOW TO STORE ENTEROSGEL®

- ENTEROSGEL® should not be used after the expiry date on the package.
- Keep out of reach of children.
- Store ENTEROSGEL® at temperature between 4 °C and 30 °C.
- Do not freeze.
- Keep away from direct sunlight and heat.
- The expiration date on the package refers to when the product is unopened and when properly stored.

For sachets

- Each sachet should be used only once after it is opened.
- Each sachet is disposable and should be opened immediately before use.
- Do not reuse partially used sachets to prevent microbial contamination.

For tubes

- Close the lid of the tube tightly after opening and after each use to avoid drying and to prevent microbial contamination.

When squeezing ENTEROSGEL® out of the tube or a sachet some amount of liquid may appear.

6. CONTENT OF THE PACK AND OTHER INFORMATION

Composition: Polymethylsiloxane polyhydrate (methyl-silicic acid hydrogel) – 70%, purified water – 30%.

Package size

ENTEROSGEL® oral suspension
– Tube 225 g
– Tube 90 g
– Sachet 15 g (10 sachets per pack)

DISPOSAL

There are no special disposal requirements for unused ENTEROSGEL®. It can be safely disposed into the domestic waste. Packaging can be recycled.

Shelf life: Until dated indicated on package

If you have any further questions about use of ENTEROSGEL® please email: info@enterosgel.eu.

This instructions for use leaflet (IFU) is also available in other languages at www.enterosgel.eu.

MANUFACTURER:

Bioline Products s.r.o.
Pátkova 831, Libeň,
182 00 Prague 8,
Czech Republic
www.enterosgel.eu



DISTRIBUTOR :

Asure Pharma s.r.o.
Pátkova 831, Libeň,
182 00 Prague 8,
Czech Republic
info@asurepharma.com

LAST DATE OF TEXT UPDATE: 08.08.2022


VERSION: TUV/IFU/CZ/NB/4



Do not re-use




Certified medical device



Minimum shelf life



Disposable packaging



Batch code



Dispose of used packaging in appropriate waste receptacle. Packaging can be recycled



Manufacturer



A fee for the national packaging management system has been paid for this packaging.



Please read the instructions



Keep away from direct sunlight



Temperature range



CE 0123
Medical Device class IIa



Gastrointestinales Adsorbens zur Behandlung von akuten Durchfällen und Reizdarm-Syndrom mit Durchfall

EXPLANATION OF GRAPHIC SYMBOLS ON PACKAGE:

INHALT DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG

- Was ist ENTEROSGEL® und wozu wird es benutzt
- Was Sie wissen müssen, bevor Sie ENTEROSGEL® einnehmen
- Wie wird ENTEROSGEL® angewendet
- Mögliche unerwünschte Nebenwirkungen

5. Aufbewahrung von ENTEROSGEL®

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen 1.

WAS IST ENTEROSGEL® UND WOZU WIRD ES BENUTZT

ENTEROSGEL® ist eine perorale Suspension, indiziert bei:

- symptomatischer Behandlung von akuten Durchfall-Erkrankungen,**
- Reizdarm-Syndrom mit Durchfall (RDS-D).**

ENTEROSGEL® ist ein perorales Darm-Adsorbens (Enterosorbens) auf Basis von organischen Mineralen, adsorptionsfähig gegenüber einigen Gift- und Schadstoffen im Darm (z.B. Endotoxine), die es physikalisch an seiner Oberfläche bindet und somit die Häufigkeit der Darmentleerungen und damit auch die Dauer des Durchfalls reduziert.

ENTEROSGEL® wird mit dem Stuhlgang ausgeschieden und beseitigt somit die adsorbierten Toxine und Schadstoffe, was eine wohltuende Auswirkung bei der Behandlung von indizierten Zuständen haben kann.

ENTEROSGEL® lindert Durchfall, Bauchschmerzen, Blähungen und Entleerungszwang bei Patienten mit RDS-D.

ENTEROSGEL® enthält keine Konservierungsstoffe, Gluten, Zucker, Süßstoffe, Laktose, Fette, Geschmacksverstärker, Farbstoffe oder Zutaten pflanzlichen oder tierischen Ursprungs.

2. WAS SIE WISSEN MÜSSEN, BEVOR SIE ENTEROSGEL® EINNEHMEN

Benutzen Sie kein ENTEROSGEL® (Kontraindikation):

- wenn Sie gleichzeitig perorale Arzneimittel mit modifizierter (gesteuerter) Freisetzung einnehmen.
- wenn Sie an Darmatonie oder Darmverschluss (ernsthaftes Verstopfen infolge Darmobstruktion) leiden.
- Im Falle der Unverträglichkeit des Präparates in der Vergangenheit.

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Benutzen Sie ENTEROSGEL® mindestens zwei Stunden vor oder nach der Einnahme eines peroralen Arzneimittels. ENTEROSGEL® kann die Absorption mancher Medikamente beeinflussen, die peroral eingenommen werden. Wenn Sie Arzneimittel anwenden, können Sie hinsichtlich der Einnahme von ENTEROSGEL® auch Ihren Arzt oder Apotheker zu Rate ziehen.
- Im Falle von langer anhaltendem Durchfall ist es notwendig, sich vor der Anwendung von ENTEROSGEL® mit Ihrem Arzt zu beraten, zwecks Bestimmung einer Diagnose der zugrunde liegenden Krankheit.
- Bei Kindern sollte die Behandlung von Durchfall durch ausreichende Flüssigkeitszufuhr oder orale Rehydrationslösung ergänzt werden, um eine Dehydrierung zu verhindern.
- Bei Erwachsenen wird während der Behandlung mit ENTEROSGEL® eine Flüssigkeitszufuhr oder eine orale Rehydrationslösung empfohlen, um eine angemessene Rehydratation sicherzustellen.
- Überschreiten Sie nicht die empfohlene Behandlungsdauer und nehmen Sie ENTEROSGEL® nicht zusammen mit Nahrungsmitteln ein, um eine mögliche Adsorption von Vitaminen und Nährstoffen zu vermeiden.

• Hält der Durchfall länger als zwei Tage an, ist es notwendig, einen Arzt aufzusuchen.

- Bei Fieber, Blut im Stuhl, Anzeichen von Dehydrierung, sechs oder mehr Stuhlgänge in den letzten 24 Stunden, Durchfall und Erbrechen gleichzeitig, starken oder ständigen Bauchschmerzen suchen Sie so schnell wie möglich einen Arzt auf, besonders, wenn Kinder betroffen sind.
- Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosis und die empfohlene Behandlungsdauer.

• Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie derzeit andere Darmadsorbens einnehmen, wie z.B. Produkte, die Aktivkohle, Lehm oder Kaolin enthalten. Ihr Arzt wird Ihnen vielleicht raten, diese nicht gleichzeitig mit ENTEROSGEL® einzunehmen.

- ENTEROSGEL® ist nicht für die Anwendung bei akuten chemischen Vergiftungen oder Medikamentenüberdosierungen indiziert.
- Nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

ENTEROSGEL® kann auch während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden. Es wird empfohlen, dass Sie Ihren Arzt aufsuchen, wenn Sie sich während der Schwangerschaft oder Stillzeit nicht wohl fühlen. Bitte beraten Sie sich vor der Einnahme von ENTEROSGEL® mit Ihrem Arzt.

3. WIE WIRD ENTEROSGEL® ANGEWENDET

- Nehmen Sie die entsprechende Dosis von ENTEROSGEL® nach dem ersten dünnen Stuhlgang ein.
- Benutzen Sie ENTEROSGEL® mindestens 2 Stunden vor oder nach der Einnahme eines peroralen Medikamentes.
- Nehmen Sie ENTEROSGEL® mindestens 1-2 Stunden vor oder nach dem Essen ein.
- Vor der Anwendung verdünnen Sie die Dosis mit Wasser in Zimmertemperatur.
- Benutzen Sie den Beutel sofort nach dem Öffnen.
- Die Tube vor dem Öffnen und jedem Gebrauch gut schütteln.
- Die Tube bis zu 30 Tagen nach dem Öffnen verbrauchen.

Alter Dosierung Wie oft

Unter 1 Jahr	2,5 g (= 1/2 Teelöffel) verdünnen in 7,5-15 ml Wasser.	3x täglich
1-6 Jahre	5 g (= 1 Teelöffel) verdünnen in 50-100 ml Wasser.	3x täglich
7-14 Jahre	10 g (= 2 Teelöffel) verdünnen in 50-100 ml Wasser.	3x täglich
15+ und Erwachsene	15 g bis 22,5 g (= 1 Esslöffel oder 1-1,5 Beutel) verdünnen in 200 ml Wasser.	3x täglich

Behandlungsdauer mit ENTEROSGEL®:

- 3-5 Tage bei akutem Durchfall.

• Bis zu 30 Tagen bei Reizdarm-Syndrom mit Durchfall. Die Pause zwischen wiederholter Anwendung sollte mindestens 3 Tage betragen.

- Bei Kindern unter 3 Jahren wird empfohlen, vor der Eingabe den Arzt zu fragen.
- Am Anfang der Behandlung (Tag 1) kann die erste Dosis verdoppelt werden und dann mit einzelner Dosis nach jedem Stuhlgang fortgesetzt werden. Am ersten Tag maximal acht Dosen.
- Bei Behandlung von chronischem Durchfall kann die Dosierung an Konsistenz und Häufigkeit des Stuhlgangs angepasst werden. Bei dünnem Stuhlgang kann eine doppelte Dosis bis zu 3x täglich eingenommen werden, bei normaler Stuhlgang dann auf eine Dosis 1x täglich senken. Höchstens können sechs Dosen am Tag eingenommen werden.
- Die Behandlung mit ENTEROSGEL® ist zu unterbrechen, wenn Sie 1-2 Tage keinen Stuhlgang haben, dann erhöhen Sie die Wasserzufluhr und setzen die Behandlung nach dem nächsten Stuhlgang fort.

4. MÖGLICHE UNERWÜNSCHTE NEBENWIRKUNGEN

Verstopfung, Übelkeit

5. AUFBEWAHRUNG VON ENTEROSGEL®

- ENTEROSGEL® darf nicht nach dem auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum benutzt werden.
- Außer Reichweite von Kinder aufbewahren.
- ENTEROSGEL® bei Temperaturen von 4 °C bis 30 °C aufbewahren.
- Vor Frost schützen.
- Setzen Sie das Präparat nicht übermäßiger Hitze oder direktem Sonnenlicht aus.
- Die auf der Verpackung angegebene Haltbarkeitsdauer bezieht sich auf das ungeöffnete Produkt bei sachgemäßer Lagerung.

Beutel

- Einmal geöffnet, kann jeder Beutel nur einmal verwendet werden.
- Die Beutel sind Einwegartikel und müssen unmittelbar vor der Verwendung geöffnet werden.
- Teilweise benutzte Beutel dürfen nicht wiederverwendet werden, um eine mikrobielle Kontamination zu vermeiden.

Tuben

- Nach dem Öffnen und nach jedem Gebrauch die Kappe der Tube wieder fest verschließen, um ein Austrocknen und eine mikrobielle Kontamination zu verhindern.

Beim Herausdrücken von ENTEROSGEL® aus der Tube oder dem Beutel kann eine kleine Menge Flüssigkeit austreten.

6. INHALT DER PACKUNG UND WEITERE INFORMATIONEN

Inhaltsstoffe: Polymethylsiloxan-Polyhydrat (Methylkieselsäure-Hydrogel) – 70%, gereinigtes Wasser – 30%.

Verpackungsgrößen

- ENTEROSGEL® perorale Suspension
- Tube 225 g
- Tube 90 g
- Beutel 15 g (10 Beutel je Packung)

ENTSORGUNG

Auf die Entsorgung des unverbrauchten ENTEROSGEL® beziehen sich keine besonderen Maßnahmen. Das Präparat kann bedenkenlos mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Die Verpackung kann wiederverwertet werden.

Haltbarket: bis zum Verfallsdatum auf der Verpackung

Haben Sie weitere Fragen bezüglich der Anwendung von ENTEROSGEL®, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@enterosgel.eu.

Diese Packungsbeilage gibt es auf www.enterosgel.eu auch in anderen Sprachen.

HERSTELLER:

Bioline Products s.r.o.
Pátkova 831, Libeň,
182 00 Prague 8,
Tschechische Republik
www.enterosgel.eu



DISTRIBUTIEU:

Asure Pharma s.r.o.
Pátkova 831, Libeň,
182 00 Prague 8,
Tschechische Republik
info@asurepharma.com

LETZTES DATUM DER TEXTAKTUALISIERUNG:
08.08.2022

VERSION: TUV/IFU/CZ/NB/4

ERKLÄRUNG DER GRAPHISCHEN SYMBOLE AUF DER VERPACKUNG:



Nicht zur Wiederverwendung



CE Zertifiziertes Medizinprodukt



Verwendbar bis Einweg-Verpackung




Die benutzte Verpackung ist in den entsprechenden Müllbehälter zu entsorgen. Die Verpackung ist wiederverwertbar



Für diese Verpackung wurde eine Gebühr an die autorisierte Verpackungsgesellschaft entrichtet.



Gebrauchsanweisung beachten



Vor Sonnenlicht schützen.



CE 0123 Medizinprodukt Klasse IIa